



Les infections sexuellement transmissibles (IST)

1. Deux exemples d'IST

- La **syphilis** est une IST due à une bactérie, le tréponème pâle. Le **sida**, syndrome de l'immunodéficience acquise, est dû au virus de l'immunodéficience humaine.
- Les **symptômes** des IST sont localisés au niveau des organes génitaux :
 - **chez l'homme** : démangeaisons, boutons sur le sexe, brûlures en urinant, écoulement anormal ;
 - **chez la femme** : douleur lors des relations sexuelles, démangeaisons, boutons sur le sexe.
- Une **personne séropositive**, porteuse du virus, ne présente aucun signe de la maladie, mais peut la transmettre. Chez la personne malade du sida, on voit apparaître des maladies graves suite à l'affaiblissement des défenses immunitaires.

2. Les modes de contamination

- Les **trois voies de transmission** des IST sont :
 - la voie **foeto-maternelle** ;
 - la voie **génitale** ;
 - la voie **sanguine**.

3. La conduite à tenir suite à une prise de risque ou à une contamination

- La plupart des IST se soignent avec un **traitement précoce** et **adapté**. Une IST mal soignée peut être source de complications : stérilité, cancer du col de l'utérus.
- Lors d'une prise de risque liée au sida, il faut consulter un médecin au plus vite ou se rendre aux urgences dans les **48 heures** pour obtenir le traitement d'urgence.
- En cas de contamination, consulter un médecin, prendre le traitement jusqu'au bout et prévenir son ou ses partenaires.

4. Les moyens de prévention

- La **prévention** passe par :
 - l'information ;
 - l'usage correct du préservatif ;
 - la limitation du nombre de partenaires ;
 - la vaccination pour certaines IST (hépatite B et papillomavirus).

5. Les structures d'accueil, d'aide et de soutien

- Il existe des **centres de dépistage** des IST : les **CeGIDD** (centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic).